

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Alectinib	Lungenkrebs	Wirksamkeit	Test auf Vorhandensein der Anaplastischen Lymphomkinase (ALK) (ALK) durch den Tumor Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Feb 2017	Fachinformation
Anastrozol	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf Hormonrezeptor-positive Brustkrebszellen; positiv = Expression von Estrogen- und / oder Progesteron-Rezeptoren bei >= 1% der Zellen Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Jun 1996 bei metastasiertem Brustkrebs Zulassung auch ohne Vortest; weitere Anastrozol-Präparate auf dem Markt, aber mit weniger Anwendungsgebieten	Fachinformation
Arsentrioxid	Akute Promyelozyten-Leukämie	Wirksamkeit	Test auf Vorhandensein des Promyelozytenleukämie-/ Retinsäurerezeptor-alpha (PML/RAR-alpha) Gens Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Mrz 2002	Fachinformation
Ataluren	Duchenne Muskeldystrophie	Wirksamkeit	Test auf Nonsense-Mutation im Dystrophie-Gen Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Jul 2014	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Azathioprin	Immunsuppressivum	Nebenwirkungen	<p>Test auf Thiopurin-Methyltransferase (TPMT)-Mangel durch Gen- oder Enzymtest wegen möglicher extremer myelosuppressiver Wirkung</p> <p>keine Anwendung bei positivem Test</p> <p>empfohlener Test seit Aug 2007</p> <p>positives Testergebnis bei ca. 0,3 % der Patienten, 10 % mit mittlerem Risiko; Testempfehlung nur bei sofortiger Gabe der vollen Dosis</p>	Fachinformation
Binimetinib	Melanom	Wirksamkeit	<p>Test auf BRAF V600-Mutation</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Sep 2018</p> <p>Anwendung in Kombination mit Encorafenib (Braftovi®)</p>	Fachinformation
Blinatumomab	Akute lymphatische Leukämie	Wirksamkeit	<p>Test auf Philadelphia-Chromosom negative Ausprägung der Leukämie</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Nov 2015</p>	Fachinformation
Bosutinib	Chronisch myeloische Leukämie	Wirksamkeit	<p>Test auf Philadelphia-Chromosom</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Mrz 2013</p> <p>positives Testergebnis bei ca. 30 % der ALL-Patienten</p>	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Brentuximab vedotin	Hodgkin Lymphom und anaplastisches großzelliges Lymphom	Wirksamkeit	<p>Test auf CD30-Überexpression auf den Tumorzellen (erfolgt bei Erstdiagnose)</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Okt 2012</p>	Fachinformation
Brexpiprazol	Schizophrenie	Nebenwirkungen	<p>Test auf CYP2D6-Metabolisierungstyp</p> <p>Dosisanpassung bei langsamen Metabolisierern</p> <p>empfohlener Test seit Jul 2018</p>	Fachinformation
Brigatinib	Lungenkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf Vorhandensein der Anaplastischen Lymphomkinase (ALK)</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Nov 2018</p>	Fachinformation
Carbamazepin	Epilepsie	Nebenwirkungen	<p>Test auf Vorhandensein des HLA-B*1502-Allels bei Patienten, die von Han-Chinesen oder Thailändern abstammen (erhöht Risiko für schwere Hautreaktionen)</p> <p>keine Anwendung bei positivem Test</p> <p>empfohlener Test seit Jun 2013</p> <p>positives Testergebnis vor allem bei Ostasiaten</p>	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Ceritinib	Lungenkrebs	Wirksamkeit	Test auf Vorhandensein der Anaplastischen Lymphomkinase (ALK) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Mai 2015	Fachinformation
Cetuximab	Darmkrebs	Wirksamkeit	Test auf nicht-mutiertes (Wildtyp) RAS-Gen Anwendung nur bei nicht-mutierter RAS-Variante Pflichttest seit Jul 2008 positives Testergebnis bei ca. 60 % der Patienten	Fachinformation
Cobimetinib	Melanom	Wirksamkeit	Test auf BRAF V600-Mutation Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Nov 2015 Anwendung in Kombination mit Vemurafenib	Fachinformation
Crizotinib	Lungenkrebs	Wirksamkeit	Test auf Vorhandensein des Fusionsgens Echinoderm microtubule-associated protein-like 4 anaplastic lymphoma kinase (EML4-ALK) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Okt 2012 positives Testergebnis bei 3-5 % der Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Dabrafenib	Melanom	Wirksamkeit	<p>Test auf BRAF-V600-Mutation im Tumorgewebe</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Aug 2013</p> <p>Mutation kommt bei etwa 50 % der Patienten vor</p>	Fachinformation
Dacomitinib	Lungenkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf aktiverende Mutation der EGFR (epidermal growth factor receptor)-Tyrosinkinase</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Apr 2019</p>	Fachinformation
Dasatinib	Akute lymphatische Leukämie	Wirksamkeit	<p>Test auf Philadelphia-Chromosom; per FISH oder PCR (Polymerase Kettenreaktion)</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Nov 2006</p> <p>positives Testergebnis bei ca. 30 % der ALL-Patienten</p>	Fachinformation
Durvalumab	Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf PD-L1-Exprimierung auf mehr als 1 Prozent der Tumorzellen</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Sep 2018</p>	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Eliglustat	Morbus Gaucher	Wirksamkeit	<p>Test auf Metabolisierungstyp in Bezug auf Cytochrom-P450 Typ 2D6 (CYP2D6)</p> <p>Dosierung entsprechend Metabolisierungstyp</p> <p>Pflichttest seit Jan 2015</p> <p>Behandlung von langsamen, intermediären und schnellen Metabolisierern mit unterschiedlichen Dosierungen; keine Anwendung bei ultraschnellen Metabolisierern oder unklarem Metabolisierungsstatus</p>	Fachinformation
Encorafenib	Melanom	Wirksamkeit	<p>Test auf BRAF V600-Mutation</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Sep 2018</p> <p>Anwendung in Kombination mit Mektovi</p>	Fachinformation
Erlotinib	Lungenkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf aktivierende Mutationen der EGFR (epidermal growth factor receptor)-Tyrosinkinase</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Aug 2011</p> <p>Testpflicht nur bei Erstlinientherapie von Lungenkrebs. Anwendung als Erhaltungstherapie, Zweit- oder Folgelinientherapie erfolgt dagegen unabhängig vom Mutationsstatus</p>	Fachinformation
Everolimus	Brustkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf HER2/neu-Expression</p> <p>Anwendung nur bei HER2/neu-negativen Tumoren</p> <p>Pflichttest seit Jul 2012</p>	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Exemestan	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf Estrogenrezeptor-positive Brustkrebszellen; positiv = Expression von Estrogen-Rezeptoren nachweisbar Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Dez 1999 bei metastasiertem Brustkrebs Zulassung auch ohne Vortest	Fachinformation
Fulvestrant	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf Hormonrezeptor-positive Brustkrebszellen; positiv = normale Expression von Estrogen- und Progesteron-Rezeptoren Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Mrz 2004	Fachinformation
Gefitinib	Lungenkrebs	Wirksamkeit	Test auf aktivierende Mutationen der EGFR (epidermal growth factor receptor)-Tyrosinkinase Anwendung nur bei EGFR-TK positiven Tumoren Pflichttest seit Jun 2009 positives Testergebnis bei ca. 10-15 % der Patienten	Fachinformation
Gemtuzumab ozogamin	Akute myeloische Leukämie	Wirksamkeit	Test auf CD33-positive myeloische leukämische Blasten Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Apr 2018	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Glibenclamid	Neonataler Diabetes mellitus	Wirksamkeit	Test auf Anomalien des Chromosoms 6q24 und auf Mutationen des KCNJ11-Gens Anwendung bei positivem Test empfohlener Test seit Mai 2018	Leitlinie zur Diagnostik des neonatalen Diabetes
Imatinib	Akute lymphatische und chronisch myeloische Leukämie	Wirksamkeit	Test auf Philadelphia-Chromosom; per FISH oder PCR (Polymerase Kettenreaktion) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Nov 2001 positives Testergebnis bei ca. 30 % der ALL-Patienten	Fachinformation
Inotuzumab ozogamicin	Akute lymphatische Leukämie	Wirksamkeit	Test der auf CD22-Expression auf den Tumorzellen Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Jun 2017	Fachinformation
Ivacaftor	Mukoviszidose	Wirksamkeit	Test auf bestimmte Mutationen im CFTR-Gen (z. B. G551D, G1244E, S1251N, S1255P) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Jul 2012	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Lapatinib	Brustkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf HER2-Überexpression</p> <p>Anwendung nur bei HER2-Überexpression</p> <p>Pflichttest seit Jun 2008</p> <p>positives Testergebnis bei ca. 25 % der Patientinnen; mehrere Tests vorhanden</p>	Fachinformation
LentiGlobin	Beta-Thalassämie	Wirksamkeit	<p>Test auf β^0/β^0-Genotyp</p> <p>Anwendung nur bei negativem Test</p> <p>Pflichttest seit Mai 2019</p>	Fachinformation
Letrozol	Brustkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf Hormonrezeptor-positive Brustkrebszellen; positiv = Expression von Estrogen- und/oder Progesteron-Rezeptoren bei $\geq 1\%$ der Zellen</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Jan 1997</p> <p>bei metastasierten Brustkrebs Zulassung auch ohne Vortest</p>	Fachinformation
Lomitapid	Erhöhter Cholesterin- oder Fettwertspiegel	Wirksamkeit	<p>genetischer Nachweis homozygoter familiärer Hypercholesterinämie</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>empfohlener Test seit Jul 2013</p> <p>ca. 5000 Betroffene in der EU</p>	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Lorlatinib	Lungenkrebs (NSCLC)	Wirksamkeit	Test auf Vorhandensein der Anaplastischen Lymphomkinase (ALK) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Mai 2019	Fachinformation
Lumacaftor / Ivacaftor	Mukoviszidose	Wirksamkeit	Test auf homozygote F508del-Mutation im CFTR-Gen Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Nov 2015	Fachinformation
Maraviroc	HIV 1-Infektion	Wirksamkeit	Test auf Kombinationstherapie-resistente, an den CCR5-Rezeptor andockende CCR5-trope HI-Viren Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Sep 2007	Fachinformation
Midostaurin	Akute myeloische Leukämie	Wirksamkeit	Test auf Vorliegen der FLT3-Mutation Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Sep 2017	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Migalastat	Morbus Fabry	Wirksamkeit	Test auf bestimmte Mutationen im GLA-Gen (Liste s. Fachinformation) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Mai 2016	Fachinformation
Natalizumab	Multiple Sklerose	Nebenwirkungen	Test auf Anti-JCV-Antikörper (Auslöser einer progressiven multifokalen Leukoenzephalopathie) nach Risikoabwägung ggf. umstellen auf andere Behandlung empfohlener Test seit Jun 2011 Hochrisikopatienten (mit zwei weiteren Risikofaktoren) sind etwa 0,09 % der Patienten	Fachinformation
Necitumumab	Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs	Wirksamkeit	Test auf Expression des Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Feb 2016	Fachinformation
Neratinib	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf HER2-Überexpression Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Aug 2018	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Nilotinib	Chronisch myeloische Leukämie	Wirksamkeit	<p>Test auf Philadelphia-Chromosom; per FISH oder PCR (Polymerase Kettenreaktion)</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Nov 2007</p> <p>positives Testergebnis bei ca. 95 % der CML-Patienten</p>	Fachinformation
Olaparib	Eierstock-Krebs	Wirksamkeit	<p>Test auf BRCA-Mutation</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Dez 2014</p>	Fachinformation
Osimertinib	Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs	Wirksamkeit	<p>Test auf T790M-Mutation des EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)</p> <p>Anwendung nur bei positivem Test</p> <p>Pflichttest seit Feb 2016</p>	Fachinformation
Oxcarbazepin	Epilepsie	Nebenwirkungen	<p>Test auf Vorhandensein des HLA-B*1502-Allels bei Patienten, die von Han-Chinesen oder Thailändern abstammen (erhöht Risiko für schwere Hautreaktionen)</p> <p>keine Anwendung bei positivem Test</p> <p>empfohlener Test seit Jan 2014</p> <p>positives Testergebnis bei ca. 2 bis 5 % der Mitteleuropäern</p>	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Palbociclib	Brustkrebs, ER-positiv, HER2-negativ	Wirksamkeit	Test des Tumorgewebes auf HER2 Anwendung nur bei negativem Test Pflichttest seit Nov 2016	Fachinformation
Panitumumab	Darmkrebs	Wirksamkeit	Test auf nicht-mutiertes (Wildtyp) RAS-Gen als Biomarker Anwendung nur bei nicht-mutierter RAS-Variante Pflichttest seit Dez 2007	Fachinformation
Pembrolizumab	nicht-kleinzelliger Lungenkrebs	Wirksamkeit	Test, ob Tumor PD-L1 exprimiert Anwendung nur bei positivem Test; Test nur bei Erstlinienbehandlu Pflichttest seit Jul 2016	Fachinformation
Pertuzumab	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf HER2-Überexpression Anwendung nur bei HER2-Überexpression Pflichttest seit Mrz 2013 positives Testergebnis bei ca. 25 % der Patientinnen	Fachinformation
Ponatinib	Akute lymphatische Leukämie	Wirksamkeit	Test auf Philadelphia-Chromosom Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Jul 2013 positives Testergebnis bei ca. 30 % der ALL-Patienten	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Prajmalin	Herzrhythmusstörungen	Nebenwirkungen	Test auf Polymorphismus von CYP 450 2D6 vor Beginn einer Langzeittherapie Dosisanpassung bei Defizienz des CYP 450 2D6-Systems Pflichttest seit Okt 2007 positives Testergebnis bei 7-8 % der Bevölkerung Status besteht mindestens seit 2007	Fachinformation
Ribociclib	Brustkrebs, ER-positiv, HER2-negativ	Wirksamkeit	Test des Tumorgewebes auf HER2 Anwendung nur bei negativem Test Pflichttest seit Aug 2017	Fachinformation
Rucaparib	epitheliales Ovarial-, Eileiter- oder Peritonealkarzinom	Wirksamkeit	Test auf BRCA-Mutationen (Keimbahn und/oder somatisch) Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Aug 2018	Fachinformation
Tamoxifen	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf Hormonrezeptor-positive Brustkrebszellen; positiv = normale Expression von Estrogen- und Progesteronrezeptoren Anwendung nur bei positivem Test empfohlener Test seit Feb 2001	St Gallen Konsensus Konferenz 2001

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Tezacaftor / Ivacaftor	Mukoviszidose	Wirksamkeit	Test auf homozygote F508del Mutation bzw. bestimmte CTFR-Mutationen bei heterozygoter F508del Mutation Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Okt 2018	Fachinformation
Toremifen	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf Hormonrezeptor-positive Brustkrebszellen; positiv = normale Expression von Estrogen- und Progesteron-Rezeptoren Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Feb 1996	Fachinformation
Trametinib	Melanom	Wirksamkeit	Test auf BRAF V600-Mutation Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Jun 2014	Fachinformation
Trastuzumab	Brustkrebs und Magenkrebs	Wirksamkeit	Test auf HER2-Überexpression bei Brustkrebs; Nachweis der HER2-Proteine oder der Zahl der Genkopien Anwendung nur bei HER2-Überexpression Pflichttest seit Aug 2000 positives Testergebnis bei ca. 25 % der Patientinnen; mehrere Tests vorhanden	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Trastuzumab emtansin	Brustkrebs	Wirksamkeit	Test auf HER2-Überexpression Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Nov 2013 positives Testergebnis bei ca. 25. % der Patientinnen	Fachinformation
Vandetanib	Medulläres Schilddrüsenkarzinom	Wirksamkeit	Test auf RET-Mutation (rearranged during transfection) evtl. geringeren Nutzen bei negativem Test berücksichtigen empfohlener Test seit Feb 2012	Fachinformation
Vemurafenib	Melanom	Wirksamkeit	Test auf BRAF-V600-Mutation im Tumorgewebe Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Feb 2012 Mutation kommt bei etwa 50 % der Patienten vor	Fachinformation
Venetoclax	Chronisch lymphatische Leukämie	Wirksamkeit	Test auf 17p-Deletion oder TP53-Mutation Anwendung bei bestimmten Patienten bei positivem Test Pflichttest seit Dez 2016	Fachinformation

Personalisierte Arzneimittel in Deutschland

Wirkstoff	Krankheitsgebiet	Test auf	Testbeschreibung	Quelle
Voretigen neparvovec	Netzhautdystrophien, ererbte	Wirksamkeit	Test auf biallelische RPE65-Mutation Anwendung nur bei positivem Test Pflichttest seit Nov 2018	Fachinformation
