

**VFA–Übersicht über  
Indikationserweiterungen, neue Kombinationen  
und galenische Innovationen**

**2006**

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Adalimumab	Humira	Abbott	Morbus Bechterew	Selektive Immun-suppressiva	Neue Indikation	06/2006
Aprepitant	Emend	MSD	Verhütung von Erbrechen/Übelkeit nach OPs	Antiemetika und Arzneimittel gegen Nausea	Neue Indikation	05/2006
Aripiprazol	Abilify	Otsuka Pharmaceuticals	Zur schnellen Kontrolle von Agitiertheit und Verhaltensstörungen bei schizophrenen Patienten, wenn orale Therapie nicht angebracht ist.	Antipsychotikum	Neue Indikation	10/2006
Atorvastatin	Sortis	Pfizer	Primärprävention kardiovaskulärer Ereignisse	HMG-CoA-Reduktase-hemmer	Neue Indikation	05/2006
Beclometason/ Formoterol	Foster/Inuvair	Asche Chiesi/ UCB	Asthma	Corticoid/ $\beta$ -Blocker	Neue Wirkstoffkombination	08/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Bimatoprost/Timolol	Ganfort	Allergan	Senkung des erhöhten Augeninnendrucks bei Patienten mit Engwinkelglaukom oder okularer Hypertension, die auf lokale Betablocker oder Prostaglandinderivate allein nicht ausreichend ansprechen.	Betalocker/ Prostaglandin-analoga	Neue Wirkstoffkombination	09/2006
Bosentan	Tracleer	Actelion	Pulmonale arterielle Hypertension in Assoziation mit kongenitalen Herzfehlern und Eisenmenger-Physiologie	Andere Antihypertonika	Neue Indikation	10/2006
Brimonidin/Timolol	Combigan	Allergan	Zur Senkung des erhöhten Augeninnendrucks bei Patienten mit chronisch offen-winkligem Glaukom oder okularem Hochdruck, die auf topische Betablocker nicht genügend ansprechen.	Alpha-adrenerger rezeptor-Agonist und topischer Betablocker	Neue Wirkstoffkombination; bei Patienten, die auf die Behandlung mit einem der beiden Wirkstoffe allein nicht genügend ansprechen.	01/2006
Buprenorphin/ Naloxon	Suboxone	Schering-Plough	Zur Substitution bei Opioidabhängigkeit	Mittel zur Behandlung der Opiatabhängigkeit /Opiat-Antagonist	Neue Wirkstoffkombination; der Suchtkranke erlangt und behält im Entzug seine geistige Klarheit. Er kann sich wieder Ziele setzen, sie verfolgen und	09/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
					erreichen. So wird eine soziale Integration möglich(er). Außerdem bietet die Kombination ein hohes Maß an Anwendungssicherheit.	
Budesonid	Pulmax	Ivax Pharma	Asthma bronchiale	Inhalative Glukokortikoide	Neue Darreichungsform; neue X-ACT-Technologie: Active Metering-Cyclone-Separator Technologie: neuartige Verwirbelungstechnik, selbst bei geringem Atemflussvolumen korrekte Dosierung	04/2006
Cetuximab	Erbix	Merck KGaA	Kopf- und Halskarzinome in Kombination mit Strahlentherapie	Antineoplastische Mittel, monoklonaler Antikörper	Neue Indikation	04/2006
Celecoxib	Onsenal	Pfizer	Reduzierung der Anzahl von adenomatösen Darmpolypen bei Familiärer Adenomatöser Polyposis als Ergänzung zu chirurgischen Maßnahmen und weiterer	Andere antineoplastische Mittel	Neue Indikation und Stärke	05/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
			endoskopischer Kontrolle			
Clarithromycin	Clarosip	Grünenthal	Behandlung akuter und chronischen Infektionen, die durch Clarithromycin-empfindliche Erreger verursacht werden, z.B. Otitis media, Atemwegsinfektionen; für Kinder ab 2 kg KG	Makrolide	Neue Darreichungsform; eltern- und kindgerecht; Trinkhalm mit geschmacksneutralen Clarithromycin-Pellets	10/2006
Clopidogrel	Plavix/ Iscover	Sanofi-Aventis/ BMS	In Kombination mit ASS zur Prävention atherothrombotischer Ereignisse bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom	Plättchenaggregationshemmer ohne Heparin	Neue Indikation	09/2006
Deferoxamin	Deferoxaminmesilat Mayne	Mayne Pharma	Diagnostik von Aluminiumüberladung	Eisenchelatbildner	Neue Indikation	05/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Docetaxel	Taxotere	Sanofi-Aventis	Metastasiertes Magen-Adeno-Karzinom;	Antineoplastische Mittel	Neue Indikation	07/2006
			in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil für die Induktionstherapie von Patienten mit inoperablem lokal fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom im Kopf-Hals-Bereich		Neue Indikation	10/2006
Drospirenon	Yasminelle 0,02/3mg	Schering	Empfängnisverhütung	Hormonelle Kontrazeptiva	Neue Darreichungsform, niedrig dosiert	09/2006
Ertapenem	Invanz	MSD	Infektionen bei Patienten mit diabetischem Fuß; zur Prophylaxe postoperativer Infektionen des Bauchraums nach elektiven kolorektalen Eingriffen bei Erwachsenen	Antibiotikum	Neue Indikationen	09/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Etanercept	Enbrel	Wyeth	Spondylitis ankylosans und psoriatische Arthritis	Selektive immunsuppressive Substanzen	Neue Indikation und neue Dosierung 50 mg 1 x wöchentlich	05/2006
Fentanyl	Matrifen	Nycomed	Schwere chronische Schmerzen	Opioid	Neue Darreichungsform: modernes Matrix-Schmerzpflaster mit zusätzlicher Diffusionskontrollmembran unterhalb der Wirkstoffmatrix; eingesetzte Wirkstoffmenge kann so um ca. 35 % im Vergleich zu anderen Matrixpflastern reduziert werden	04/2006
Hexyl 5-amino-4-oxopentanoat	Hexvix	GE Pharmaceuticals	Diagnostikum zur Erkennung von Blasenkarzinomen	Diagnostikum	Neue Indikation	7/2006
Hydromorphon	Jurnista	Janssen-Cilag	Schwere Schmerzen	Natürliche Opiumalkaloide; Betäubungsmittel	Neue Darreichungsform; Osmose-Technologie OROS: saugfähiger Träger zieht Wasser aus dem Magen-Darm-Trakt in die Kapsel,	07/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
					Wirkstoff wird über 24 Stunden kontinuierlich nach außen gedrückt	
Ibandronat	Bonviva Bondenza	Roche/GSK	Osteoporose	Bisphosphonat	Neue Darreichungsform; Vierteljährliche i.v. Injektion	05/2006
Imatinib	Glivec	Novartis	Behandlung Erwachsener mit nicht resezierbarem Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) und Erwachsener mit rezidivierendem und/oder metastasiertem DFSP, die für eine chirurgische Behandlung nicht in Frage kommen	Protein Tyrosinkinase-Inhibitor	Neue Indikation	09/2006
Imiquimod	Aldara	Laboratoire 3M	Klinisch typischen, nicht hyperkeratotischen, nicht hypertrophen aktinischen Keratosen (AKs) im Gesicht oder auf der Kopfhaut bei immunkompetenten Erwachsenen, wenn die Größe oder die Anzahl der	Topische Chemotherapeutika, antivirale Mittel,	Neue Indikation	12/2006



## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
			Läsionen die Wirksamkeit und/oder die Akzeptanz einer Kryotherapie begrenzen und andere topische Behandlungsmöglichkeiten kontraindiziert oder weniger geeignet sind.			
Infliximab	Remicade	Centocor	Colitis ulcerosa; Wechsel von der Drittlinien zur Zweitlinientherapie bei Morbus Chron	TNF-alfa-Hemmer	Neue Indikationen	09/2006
Insulin human	Exubera	Pfizer	Diabetes	Insulin	Neue Darreichungsform; inhalierbares Insulin	05/2006
Interferon beta-1b	Betaferon	Schering	Bei Patienten mit einem ersten Schub, der eine Multiple Sklerose vermuten lässt	Interferone	Neue Indikation	06/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Ioflupan [123 I]	DatSCAN	GE Healthcare	Diagnostikum zur Differenzierung einer Demenz mit Lewy-Körperchen von Alzheimerscher Erkrankung.	Diagnostikum	Neue Indikation	09/2006
Kombinationsimpfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken	Priorix-Tetra	GlaxoSmithKline	Masern, Mumps, Röteln und Windpocken	Lebendimpfstoff	Neue Wirkstoffkombination (zusätzlich gegen Windpocken)	08/2006
Letrozol	Femara	Novartis	Adjuvante Initialtherapie bei Frauen in der Postmenopause mit frühem hormon-sensitivem Brustkrebs	Aromatase-Hemmer (Enzym-Inhibitoren)	Neue Indikation	03/2006
Levetiracetam	Keppra	UCB	Begleittherapie gegen myoklonische Krämpfe bei erwachsenen und jugendlichen Epileptikern ab 12 Jahren;  Monotherapie partieller epileptischer Krämpfe mit oder ohne sekundärer Generalisation bei Patienten ab 16 Jahren	Antiepileptikum	Neue Indikation	04/2006  09/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Lopinavir/Ritonavir	Kaletra	Abbott	HIV/Aids	Proteasehemmer	Neue Darreichungsform; reduzierte Einnahmehäufigkeit, unabhängig von den Mahlzeiten und ungekühlte Lagerung	06/2006
Metformin/Pioglitazon	Competact	Takeda	Diabetes Typ-2	Kombination oraler Antidiabetika	Neue Wirkstoffkombination	10/2006
Nebivolol	Nebilet	Berlin Chemie	Herzinsuffizienz; zusätzlich zur Standardbehandlung bei Patienten ab 70 Jahren	Betablocker	Neue Indikation	06/2006
Oxaliplatin	Eloxatin	Sanofi-Aventis	Kolorektales Karzinom	Zytostatikum	Neue Darreichungsform: Konzentrat statt Lyophilisat: Kühlung ist nicht mehr notwendig, verbesserter Arbeitsschutz und Kostenersparnis bei der Zubereitung der Infusionslösung	03/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Oxycodon/Naloxon	Targin	Mundipharma	Starke bis sehr starke Schmerzen	Natürliche Opiumalkaloide	Neue Wirkstoffkombination; verhindert opioidinduzierte Obstipation	10/2006
Peginterferon alfa-2a	Pegasys	Roche	Chronische Hepatitis B	Interferone	Neue Indikation	01/2006
Pergabalin	Lyrica	Pfizer	Behandlung von zentralen neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenen	Antiepileptikum	Neue Indikation	09/2006
Pioglitazon	Actos	Takeda	Als orale Dreifach-Kombinationstherapie zusammen mit Metformin und einem Sulfonylharnstoff bei Patienten (insbesondere übergewichtigen Patienten), die trotz einer oralen Zweifach-Kombinationstherapie keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreichen.	Orale blutzucker-senkende Arzneimittel	Neue Indikation	10/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Posaconazol	Noxafil/ Posaconazol SP	Schering Plough	Invasive Aspergillose bei Patienten, deren Erkrankung therapieresistent ist gegenüber Amphotericin E oder Itraconazol bzw. bei Unverträglichkeit dieser Arzneimittel	Antimykotika zur systemischen Anwendung – Triazol-Derivate	Neue Indikation	10/2006
Pramipexol	Sifrol, Mirapexin	Boehringer Ingelheim	Restless Legs Syndrom (unruhige Beine)	Parkinsonmittel	Neue Indikation	04/2006
Pregabalin	Lyrica	Pfizer	Generalisierte Angststörung	Schmerz/Epileptisiemittel	Neue Indikation	07/2006
Pioglitazon/Metformin	Competact	Takeda	Typ II Diabetes	Kombinationen mit oralen Antidiabetika	Neue Wirkstoffkombination	10/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Rituximab	Mabthera	Roche	Erhaltungstherapie bei refraktärem folliculärem Lymphom; in Kombination mit Methotrexat bei Patienten mit schwerer rheumatoider Arthritis	Monoklonale Antikörper	Neue Indikationen	07/2006
Rivastigmin	Exelon Prometax	Novartis	Leichte bis mittelschwere Demenz bei idiopathischer Parkinson-Krankheit	Cholinesterase-hemmer	Neue Indikation; zuvor bei M. Alzheimer	04/2006
Ropinirol	Adartel	GSK	Restless Legs Syndrom	Dopaminagonist	Neue Indikation	06/2006
Rosiglitazon/ Glimepid	Avaglim	SmithKline Beecham	Zur Behandlung des Typ 2 Diabetes mellitus bei Patienten, deren Blutzucker trotz einer Monotherapie mit Sulfonylharnstoff in optimaler Dosierung unzureichend eingestellt ist, und für die eine Behandlung mit Metformin wegen bestehender Gegenanzeigen oder Unverträglichkeit	Thiazolidindion/ Sulfonylharnstoff	Neue Wirkstoffkombination aus zwei Antidiabetika mit einander ergänzenden Wirkmechanismen zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus.	10/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
			ungeeignet ist.			
Sildenafil	Revatio	Pfizer	Lungenhochdruck	PDE-5-Hemmer	Neue Indikation; geringere Dosierung (20 mg) als bei niedrigst dosiertem Viagra (25 mg); weiße, runde Tablette statt blauer, rautenförmiger Tabl.	01/2006
Topotecan	Hycamtin	GlaxoSmithKline	Patientinnen und Patienten mit rezidiviertem kleinzelligem Bronchialkarzinom [SCLC], die für eine Wiederbehandlung mit dem in der Primärtherapie verwendeten Behandlungsschema nicht geeignet sind	Antineoplastisches und immunmodulatorisches Agens; Klasse: Gyrasehemmer	Neue Indikation;	01/2006
			in Kombination mit Cisplatin zur Behandlung von Patientinnen mit Zervixkarzinom im Rezidiv nach Strahlentherapie und von Patientinnen im Stadium IVB der Erkrankung		Neue Indikation	11/2006

## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Wirkstoffname	Produktname	Pharmazeutischer Unternehmer	Indikation	Stoff- oder Indikationsgruppe	Bemerkung	Datum
Trastuzumab	Herceptin	Roche	Frühes Stadium von Brustkrebs	Monoklonale Antikörper	Neue Indikation	05/2006
Travoprost/Timolol	DuoTrav	Alcon	Senkung des erhöhten Augeninnendrucks	Beta-Adrenozeptor-Antagonisten	Neue Wirkstoffkombination	5/2006



## VFA – Übersicht über Indikationserweiterungen, neue Kombinationen und galenische Innovationen 2006

Statistik:

Indikationserweiterungen:	35
Neue Wirkstoffkombinationen:	10
Neue Darreichungsform:	9
TOTAL:	54